

Moxifloxacin Micro Labs 5 mg/ml Augentropfen, Lösung

Wirkstoff: Moxifloxacinhydrochlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung beachten?
3. Wie ist Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen



1. Was ist Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung und wofür wird es angewendet?

Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung wird zur Behandlung von bakteriellen Infektionen des Auges (Konjunktivitis) angewendet. Der Wirkstoff ist Moxifloxacin, ein ophthalmologisches Antiinfektivum.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung beachten?

Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung darf nicht angewendet werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Moxifloxacin, andere Chinolone oder einen der sonstigen Bestandteile von Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Wenn Sie eine allergische Reaktion auf Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung haben. Allergische Reaktionen treten selten, schwere Reaktionen treten sehr selten auf. Wenn Sie allergische (Überempfindlichkeits-)Reaktionen oder Nebenwirkungen bemerken, lesen Sie bitte Abschnitt 4.
- Wenn Sie Kontaktlinsen tragen. Bitte tragen Sie keine Kontaktlinsen, wenn Sie Anzeichen einer bakteriellen Bindehautentzündung haben. Tragen Sie stattdessen Ihre Brille. Tragen Sie solange keine Kontaktlinsen, bis die Anzeichen und Symptome der Infektion verschwunden sind und bis Sie die Anwendung des Arzneimittels eingestellt haben.
- Bei Personen, die Fluorchinolone einnehmen oder intravenös anwenden, traten Sehenschwellungen und -risse auf, insbesondere bei älteren Patienten und bei Patienten, die gleichzeitig mit Kortikosteroiden behandelt wurden. Beenden Sie die Anwendung von Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung, wenn Sie Schmerzen entwickeln oder die Sehnen anschwellen (Tendinitis).
- Wie bei jedem Antibiotikum kann die langfristige Anwendung von Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung zu anderen Infektionen führen.

Anwendung von Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung zusammen mit anderen Arzneimitteln.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Wenn Sie nach der Anwendung von Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung vorübergehend verschwommen sehen oder Schleiersehen auftritt, sollten Sie erst wieder Auto fahren oder Maschinen bedienen, wenn diese Anzeichen abgeklungen sind.

3. Wie ist Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt an. Bitte fragen Sie nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die übliche Dosis ist:

Erwachsene, einschließlich Ältere und Kinder: 1 Tropfen 3-mal täglich (morgens, nachmittags und abends) in das betroffene Auge oder die betroffenen Augen eintropfen.

Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung kann bei Kindern, bei Patienten über 65 Jahren und bei Patienten mit Nieren- oder Leberproblemen angewendet werden. Es gibt nur sehr begrenzte Informationen über die Anwendung dieses Arzneimittels bei Neugeborenen. Die Anwendung wird daher bei Neugeborenen nicht empfohlen.


Wenden Sie dieses Arzneimittel nur dann an beiden Augen an, wenn Ihr Arzt dies angeordnet hat. Wenden Sie Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung nur zum Eintropfen in Ihre Augen an.

Nach 5 Tagen ist die Infektion normalerweise abgeklungen. Die Behandlung sollte dann noch zusätzlich für 2 – 3 Tage fortgesetzt werden oder so lange, wie es Ihnen Ihr Arzt angeordnet hat. Wenn keine Verbesserung eintritt, kontaktieren Sie Ihren Arzt.


Hinweise zur Anwendung

Öffnen der Flasche vor der Anwendung


1. Vergewissern Sie sich vor der ersten Anwendung der Augentropfen, dass der Sicherheitsring zwischen Flasche und Verschlusskappe unversehrt ist (Abb. 1). Sie dürfen die Flasche nicht benutzen, wenn der Sicherheitsring am Flaschenhals gebrochen ist.




2. Bevor Sie die Flasche zum ersten Mal öffnen, reißen Sie den Sicherheitsring ab, um das Siegel zu brechen (Abb. 2).



3. Um die Flasche zu öffnen, entfernen Sie die Verschlusskappe, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb. 3).




4. Schrauben Sie die Verschlusskappe wieder fest auf die Flasche (Abb. 4).



Anwendung Ihrer Augentropfen


1. Waschen Sie sich zuerst die Hände.
2. Beugen Sie den Kopf nach hinten und ziehen Sie das Unterlid leicht herab, damit sich zwischen Ihrem Augenlid und Ihrem Auge eine Tasche bildet. Der Tropfen gelangt dort hinein (Abb. 5).




3. Bringen Sie die Flaschenspitze in die Nähe Ihres Auges. **Berühren Sie mit der Tropferspitze des Behältnisses nicht Ihre Augen oder Augenlid oder die Umgebung der Augen.** Es kann sonst zu Verunreinigungen der Augentropfen in der Flasche kommen (Abb. 6).



4. Drücken Sie leicht auf die Unterseite der Flasche, bis ein einzelner Tropfen des Arzneimittels in das Auge gelangt (Abb. 7).



5. Nach der Anwendung von Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung drücken Sie mit der Fingerspitze für zwei Minuten auf den inneren Augenwinkel. Dies verhindert ein Abfließen von Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung in den Körper. Dies ist wichtig bei kleinen Kindern.



6. Wenn Sie die Tropfen an beiden Augen anwenden, waschen Sie bevor Sie die Schritte 1 bis 5 an Ihrem anderen Auge wiederholen, Ihre Hände. Dies verhindert die Ausbreitung der Infektion von einem Auge zum anderen.
7. Schrauben Sie die Verschlusskappe wieder auf die Flasche bis sie diese fest berührt.

Wenn ein Tropfen Ihr Auge verfehlt, wiederholen Sie den Vorgang.

Wenn Sie eine größere Menge Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung an einem oder beiden Augen angewendet haben, können Sie das oder die Augen mit lauwarmem Wasser ausspülen. Tropfen Sie nicht mehr, bevor es Zeit für die nächste vorgeschriebene Anwendung ist.

Bei einer irrtümlichen Einnahme von Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung oder durch Gabe als Injektion fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Für Beunruhigung besteht kein Anlass, da Moxifloxacin auch in Tablettenform oder als Injektionslösung angewendet wird.

Wenn Sie die Anwendung von Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung vergessen haben

Wenn Sie die Anwendung von Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung vergessen haben, holen Sie die vergessene Anwendung so schnell wie möglich nach und setzen Sie dann das verordnete Dosierungsschema fort. Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Augentropfen oder Augensalben anwenden, sollten Sie einen zeitlichen Abstand von mindestens 5 Minuten zwischen der Anwendung von Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung und den anderen Arzneimitteln einhalten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sie können die Tropfen wie üblich anwenden, außer wenn die Nebenwirkungen schwerwiegend sind oder bei Ihnen eine schwere allergische Reaktion auftritt.

Wenn bei Ihnen eine schwere allergische Reaktion und eine der aufgeführten Nebenwirkungen auftritt, beenden Sie sofort die Anwendung von Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung und informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt: HerzKreislaufversagen, Bewusstlosigkeit, Kribbeln, Anschwellen der Hände, Füße, Fußknöchel, Gesicht, Lippen, Mund oder Kehle. Dies kann zu Schluck- oder Atembeschwerden, Kurzatmigkeit, Hautausschlägen oder Nesselsucht und Juckreiz, großen flüssigkeitsgefüllten Blasen, wunden Stellen und Geschwüren führen.

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)

Auswirkungen auf das Auge: Augenschmerzen, Augenreizung.

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen)

Auswirkungen auf das Auge: Entzündung auf der Augenoberfläche mit Schädigung der Augenoberfläche, trockenes Auge, geschädigte Blutgefäße im Auge, Jucken oder Rötung des Auges, Augenlidschwellung, Augenbeschwerden.

Auswirkungen auf den Körper: Kopfschmerzen, schlechter Geschmack im Mund.

Selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen)

Auswirkungen auf das Auge: Hornhauterkrankung, Entzündungen oder Infektionen der Bindehaut, Entzündung des Augenlids, Augenschwellung, verschwommenes Sehen oder verminderte Sehschärfe, müde Augen, Augenlidrötung.

Auswirkungen auf den Körper: Anämie, anomale Hautempfindungen, Nasenbeschwerden, Rachenschmerzen,

"Kloß im Hals"-Gefühl, Erbrechen, anomale Leberwerte bei Blutuntersuchungen.

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der vorliegenden Daten nicht abschätzbar)

Auswirkungen auf das Auge: Infektion im Auge, Trübung der Augenoberfläche, Schwellung der Hornhaut, Ablagerungen auf der Augenoberfläche, erhöhter Augeninnendruck, Kratzer auf der Augenoberfläche, Augenallergie, Augenausfluss, erhöhte Tränenproduktion, Lichtempfindlichkeit.

Auswirkungen auf den Körper: Kurzatmigkeit, unregelmäßiger Herzschlag, Schwindelgefühl, Allergie, Hautausschlag, Hautrötung, Übelkeit und Nesselsucht.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25°C lagern.

Wenden Sie die das Arzneimittel 4 Wochen nach dem ersten Öffnen nicht mehr an. Dies dient dazu Infektionen zu verhindern.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen?

Was Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung enthält

Der Wirkstoff ist Moxifloxacinhydrochlorid.

1 ml Augentropfen enthält 5 mg Moxifloxacin (entsprechend 5,45 mg Moxifloxacinhydrochlorid).

Jeder Tropfen enthält 190 Mikrogramm Moxifloxacin.

Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid, Borsäure, Salzsäure (zur pH-Einstellung), Natriumhydroxid (zur pH-Einstellung), Wasser für Injektionszwecke

Wie Moxifloxacin Micro Labs Augentropfen, Lösung aussieht und Inhalt der Packung

Klare, grünlich-gelbe Lösung.

Jede Flasche enthält 5 ml Lösung. Die Packungsgrößen sind 1 x 5 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer

Micro Labs GmbH
Lyoner Straße 14,
60528 Frankfurt

Hersteller

Micro Labs GmbH
Lyoner Straße 14,
60528 Frankfurt

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

DE: Moxifloxacin Micro Labs 5 mg/ml Augentropfen, Lösung

AT: Moxifloxacin Micro Labs 5 mg/ml Augentropfen, Lösung

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2020.