

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

# AHP 200<sup>®</sup>

## 200 mg, Filmtabletten

### Oxaceprol



#### **Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was ist AHP 200<sup>®</sup> und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von AHP 200<sup>®</sup> beachten?
3. Wie ist AHP 200<sup>®</sup> einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist AHP 200<sup>®</sup> aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

#### **1. Was ist AHP 200<sup>®</sup> und wofür wird es angewendet?**

AHP 200<sup>®</sup> wird angewendet bei Erwachsenen zur unterstützenden Behandlung von Schmerzen, die durch Arthrose (verschleißbedingte Erkrankung der Gelenke) verursacht werden.

Zusätzliche Beratung und weitere unterstützende Maßnahmen (z.B. körperliche Aktivität, ggf. Gewichtsreduktion) können den Erfolg der Behandlung fördern.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von AHP 200<sup>®</sup> beachten?**

##### **AHP 200<sup>®</sup> darf nicht eingenommen werden**

- Wenn Sie allergisch gegen Oxaceprol, Gelborange S oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile sind
- wenn Sie unter schweren Leber- oder Nierenerkrankungen leiden (schwere Leber-/Niereninsuffizienz)

##### **Einnahme von AHP 200<sup>®</sup> zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Wenn Sie mit Arzneimitteln behandelt werden, die die Blutgerinnung hemmen (Vitamin-K-Antagonisten, z.B. Warfarin, Marcumar), kann eine Beeinflussung der Blutgerinnung (Erhöhung oder Erniedrigung) durch Oxaceprol in Einzelfällen nicht ausgeschlossen werden. Deshalb dürfen Sie AHP 200<sup>®</sup> in diesem Fall nicht einnehmen.

##### **Kinder**

AHP 200<sup>®</sup> ist nicht geeignet für Kinder und Jugendliche.

##### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

AHP 200<sup>®</sup> sollte nicht während der Schwangerschaft eingenommen werden, da es nicht genügend Erfahrung zu möglichen Auswirkungen auf den Embryo oder Fötus gibt.

Es ist nicht bekannt, ob Oxaceprol in die Muttermilch übergeht. Deshalb sollte AHP 200<sup>®</sup> in der Stillzeit nicht angewendet werden.

##### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Oxaceprol hat keinen oder vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Allerdings sollten Sie mögliche Nebenwirkungen beachten (siehe Abschnitt 4).

##### **AHP 200<sup>®</sup> enthält Gelborange S**

Der Farbstoff Gelborange S (E 110) kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### **3. Wie ist AHP 200<sup>®</sup> einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt eine Filmtablette AHP 200<sup>®</sup> (200 mg Oxaceprol) 3 x am Tag, morgens, mittags und abends.

AHP 200<sup>®</sup> Filmtabletten sind zum Einnehmen.

Nehmen Sie die Filmtabletten vorzugsweise vor einer Mahlzeit, unzerkaut und mit ausreichend Flüssigkeit (z.B. ein Glas Wasser) ein.

##### **Wenn Sie eine größere Menge AHP 200<sup>®</sup> eingenommen haben als Sie sollten**

Fälle von Überdosierung sind bisher nicht bekannt. Wenn Sie zu viel AHP 200<sup>®</sup> eingenommen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Wenn Sie die Einnahme von AHP 200® vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Fahren Sie in dem bisherigen Dosierungsschema fort.

#### **Wenn Sie die Einnahme von AHP 200® abbrechen**

Außer einer Wiederkehr der Gelenkschmerzen sind keine Folgen zu erwarten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann AHP 200® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

#### **Wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bemerken, brechen Sie die Therapie mit AHP 200® sofort ab und wenden sich an Ihren Arzt:**

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen):

Schwere allergisch bedingte Reaktionen wie Gesichts-, Lippen-, Zungen-, Hals- oder Augenlid-schwellung, möglicherweise mit Nesselsucht oder Schwellung der Schleimhäute (im Mund- und Halsbereich), die zu Atembeschwerden führen können (Quincke-Ödem)

#### **Weitere mögliche Nebenwirkungen:**

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)

Übelkeit, Appetitstörung, Magenschmerzen oder Durchfall, die häufig vorübergehend sind.

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)

Allergische Reaktionen: Hautrötung, Juckreiz, Hautausschlag.

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen)

Haarausfall, Gelenkschmerzen, Entzündung der Blutgefäße, Nesselsucht.

Zunahme bestimmter weißer Blutkörperchen (allergische Eosinophilie).

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Akute depressive Stimmungslage, Kopfschmerzen, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, Sehstörungen, vorübergehende Hautausschläge, Nesselsucht am ganzen Körper (generalisierte Urtikaria), Vergrößerung der Brustdrüse bei Männern (Gynäkomastie), Blutzuckeranstieg.

#### **Meldung von Nebenwirkungen:**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist AHP 200® aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Blisterpackung und der Faltschachtel nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C lagern.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

#### **Was AHP 200® enthält**

Der Wirkstoff ist Oxaceprol. 1 Filmtablette enthält 200 mg Oxaceprol.

Die sonstigen Bestandteile sind:

*Tablettenkern:* Talkum, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Kartoffelstärke, Macrogol 6000, Macrogol 12000;

*Filmüberzug:* Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) (Ph. Eur.), Povidon K 25, Propylenglycol, Simecon-Emulsion 30 %, Titandioxid (E 171), Chinolingelb (E 104), Gelborange S (E 110), Talkum, Macrogol 6000.

#### **Wie AHP 200® aussieht und Inhalt der Packung**

AHP 200® sind gelbe, runde, konvexe Filmtabletten.

AHP 200® ist in Packungen zu 20, 100 und 300 Filmtabletten erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

##### Pharm. Unternehmer

Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Mühlstraße 50

D-66386 St. Ingbert

##### Hersteller

MIP Pharma GmbH

Kirkeler Straße 41

D-66440 Blieskastel

##### Mitvertrieb

MIP Pharma GmbH

Kirkeler Straße 41

D-66440 Blieskastel

Tel.: 0 68 42 / 96 09-0

Fax: 0 68 42 / 96 09-355

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2021.**