

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

### Pertussin<sup>®</sup> Sirup

Wirkstoff: Thymiankraut-Fluidextrakt (8,0g in 100g Sirup).

Zur Anwendung bei Kindern ab 1 Jahr, Jugendlichen und Erwachsenen.

#### **Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Pertussin<sup>®</sup> Sirup jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Pertussin<sup>®</sup> Sirup und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Pertussin<sup>®</sup> Sirup beachten?
3. Wie ist Pertussin<sup>®</sup> Sirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Pertussin<sup>®</sup> Sirup aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. WAS IST PERTUSSIN<sup>®</sup> SIRUP UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Pertussin<sup>®</sup> Sirup ist ein pflanzliches Arzneimittel bei katarrhalischen Erkrankungen der Atemwege.

#### Anwendungsgebiete:

Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim, zur Besserung der Beschwerden bei akuter Bronchitis.

Hinweis: Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf, muss ein Arzt aufgesucht werden.

### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PERTUSSIN<sup>®</sup> SIRUP BEACHTEN?**

#### **Pertussin<sup>®</sup> Sirup darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Thymian oder andere Lamiaceen (Lippenblütler), Birke, Beifuss, Sellerie, Sucrose sowie gegen einen der sonstigen Bestandteile von Pertussin<sup>®</sup> Sirup sind.

#### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Pertussin<sup>®</sup> Sirup ist erforderlich,**

- da dieses Arzneimittel 4 Vol.-% Alkohol enthält.

Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme bei Kindern von 1 - < 4 Jahren 0,32 g Alkohol, bei Kindern von 4 - 12 Jahren bis zu 0,48 g Alkohol und bei Heranwachsenden ab 12 Jahren und Erwachsenen bis zu 0,95 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren und Stillenden.

**Bei Einnahme von Pertussin® Sirup mit anderen Arzneimitteln:**

Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**

Pertussin® Sirup soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Dieses Arzneimittel enthält 4 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme (30 ml) bis zu 0,95 g Alkohol zugeführt.

Pertussin® Sirup kann daher die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigen.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile:**

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose. Bitte nehmen Sie Pertussin® Sirup erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Zwei zur Marke 15 ml gefüllte Messbecher (=30 ml) enthalten insgesamt 23,68 g Sucrose (Zucker) entsprechend ca. 2 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

**3. WIE IST PERTUSSIN® SIRUP EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Pertussin® Sirup immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Dosierung:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet ist die übliche Dosis:

Alter bzw. Körpergewicht	Einzeldosis	Tagesgesamtdosis
Kinder ab 1 - < 4 Jahre ( ca. 8 – 16 kg)	1 mal zur Marke 10 ml gefüllter Messbecher (entsprechend 1,03 g Thymiankraut- Fluidextrakt)	3 mal täglich zur Marke 10ml gefüllter Messbecher = 30 ml (entsprechend 3,10 g Thymiankraut-Fluidextrakt)
Kinder ab 4-12 Jahre (ca. 16 – 43 kg)	1 mal zur Marke 15 ml gefüllter Messbecher	4 mal täglich zur Marke 15 ml gefüllter Messbecher = 60 ml

	(entsprechend 1,55 g Thymiankraut-Fluidextrakt)	(entsprechend 6,19 g Thymiankraut-Fluidextrakt)
Kinder ab 12 Jahren, Jugendliche und Erwachsene	2 mal zur Marke 15 ml gefüllte Messbecher = 30 ml (entsprechend 3,10 g Thymiankraut-Fluidextrakt)	3-4 mal täglich zwei zur Marke 15 ml gefüllte Messbecher (30 ml) = 90 –120 ml (entsprechend 9,29-12,39 g Thymiankraut-Fluidextrakt)

Art der Anwendung:

Nehmen Sie Pertussin® Sirup mit etwas Flüssigkeit (z.B. ½ Glas Wasser) ein.

Beachten Sie die Graduierung des Messbechers!

Schütteln Sie die Flasche Pertussin® Sirup vor dem Gebrauch!

Dauer der Anwendung:

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem Verlauf der Erkrankung und ist vom Arzt zu bestimmen. Beachten Sie bitte in jedem Fall die Angaben unter "Anwendungsgebiete" und "Nebenwirkungen".

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Pertussin® Sirup zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge Pertussin® Sirup eingenommen haben, als Sie sollten:**

Vergiftungen mit Pertussin® Sirup sind bisher nicht bekannt geworden. Bei Einnahme zu großer Mengen von Pertussin® Sirup können möglicherweise die unter "Nebenwirkungen" beschriebenen Beschwerden verstärkt auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

**Wenn Sie die Einnahme von Pertussin® Sirup vergessen haben:**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

**Wenn Sie die Einnahme von Pertussin® Sirup abbrechen:**

Falls Sie das Arzneimittel absetzen, weil es bei Ihnen nicht wie erwünscht wirkt, fragen Sie bitte Ihren Arzt, ob andere Arzneimittel in Frage kommen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Pertussin® Sirup Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10 000

Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar
----------------	--

**Mögliche Nebenwirkungen:**

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. Luftnot, Hautausschläge, Nesselsucht sowie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum, auftreten.

Sehr selten kann es auch zu Magenbeschwerden, wie Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen, kommen.

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden. Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Pertussin<sup>®</sup> Sirup nicht nochmals eingenommen werden.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

**5. WIE IST PERTUSSIN<sup>®</sup> SIRUP AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Flaschenetikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 3 Wochen.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

**6. WEITERE INFORMATIONEN****Was Pertussin<sup>®</sup> Sirup enthält:**

Wirkstoff: Fluidextrakt aus Thymiankraut.

100 g (entspr. 77,5 ml) Sirup enthalten: 8,0 g Fluidextrakt aus Thymiankraut (1 : 2-2,5), Auszugsmittel: Ammoniaklösung 10% (m/m), Glycerol 85%, Ethanol 90% (V/V), Wasser (1:20:70:109).

Sonstige Bestandteile: Citronensäure-Monohydrat, Sucrose, Gereinigtes Wasser.

**Wie Pertussin<sup>®</sup> Sirup aussieht und Inhalt der Packung:**

Pertussin<sup>®</sup> Sirup ist eine klare oder schwach getrübbte, hellbraune bis bräunlichgelbe, schwach viskose Flüssigkeit in einer Braunglasflasche.

Originalpackung mit Flasche zu 240 g Sirup.

**Pharmazeutischer Unternehmer:**

*medphano* Arzneimittel GmbH

Maienbergstraße 10 - 12  
15562 Rüdersdorf bei Berlin  
Tel.: (033638) 7 49-0  
Fax: (033638) 7 49 77  
E-Mail: info@medphano.de

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im April 2010.**

---

Zusätzliche Informationen über Eigenschaften des Arzneimittels:

Pertussin<sup>®</sup> Sirup enthält einen alkoholhaltigen Extrakt aus Thymiankraut. Zubereitungen aus Thymian werden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege angewandt, können zu einer Verflüssigung von zähem Bronchialsekret und zu einer Entkrampfung der Bronchialmuskulatur beitragen und das Abhusten erleichtern. Aufgrund des Gehaltes an ätherischem Öl (Thymol) besitzt Pertussin<sup>®</sup> Sirup den typischen Thymianduft.

Pertussin<sup>®</sup> Sirup erhalten Sie exklusiv in Ihrer Apotheke.

475A0005