

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Panthenol-Lösung Lichtenstein

Wirkstoff: Dexpanthenol 5%

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Panthenol-Lösung Lichtenstein jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Panthenol-Lösung Lichtenstein und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Panthenol-Lösung Lichtenstein beachten?
3. Wie ist Panthenol-Lösung Lichtenstein anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Panthenol-Lösung Lichtenstein aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST Panthenol-Lösung Lichtenstein UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Mittel zur Wundbehandlung

Anwendungsgebiet

Zur Unterstützung der Heilung von Haut- und Schleimhautläsionen verschiedener Ätiologie.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Panthenol-Lösung Lichtenstein BEACHTEN?

Panthenol-Lösung Lichtenstein darf nicht angewendet werden, wenn

Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Dexpanthenol, Methyl(4-hydroxybenzoat), Propyl(4-hydroxybenzoat) (Parabene), Natriumbenzoat oder einem der sonstigen Bestandteile von Panthenol-Lösung Lichtenstein sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Panthenol-Lösung Lichtenstein ist erforderlich

Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen und Hauttrockenheit verursachen.

Kinder und ältere Menschen

Es gibt keine Anwendungsbeschränkungen für Kinder und ältere Menschen.

Bei Anwendung von Panthenol-Lösung Lichtenstein mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bei bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da nicht bekannt ist, wie viel Dexpanthenol durch die Haut in den Blutkreislauf aufgenommen wird, sollte bei einer großflächigen Anwendung von Panthenol-Lösung Lichtenstein während der Schwangerschaft und Stillzeit der Nutzen der Anwendung sorgfältig gegen ein mögliches Risiko abgewogen werden.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Panthenol-Lösung Lichtenstein

Natriumbenzoat kann leichte Reizungen an Haut, Augen und Schleimhäuten hervorrufen.

3. WIE IST Panthenol-Lösung Lichtenstein ANZUWENDEN?

Wenden Sie Panthenol-Lösung Lichtenstein immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Ein bis mehrmals täglich unverdünnt auf die Läsionen auftragen. Die 500 ml-Lösung zur Anwendung auf der Haut kann auch unverdünnt in Form von Spülungen oder Umschlägen angewendet werden.

Art der Anwendung

Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Panthenol-Lösung Lichtenstein zu stark oder zu schwach ist.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Panthenol-Lösung Lichtenstein Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen

In Einzelfällen Unverträglichkeitsreaktionen gegenüber Dexpanthenol.

Methyl(4-hydroxybenzoat), Propyl(4-hydroxybenzoat) bzw. Natriumbenzoat können Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST Panthenol-Lösung Lichtenstein AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach Ablauf des auf Faltschachtel und Etikett angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Haltbarkeit nach Anbruch

Originalpackung mit 50 ml: 2 Monate

Originalpackung mit 500 ml: 3 Monate

6. WEITERE ANGABEN

Was Panthenol-Lösung Lichtenstein enthält:

Der Wirkstoff ist Dexpanthenol.

100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 5 g Dexpanthenol.

Sonstige Bestandteile: Natriumbenzoat 0,5 g, Methyl(4-hydroxybenzoat) 0,07 g, Propyl(4-hydroxybenzoat) 0,03 g, Ethanol 96% 0,33 g, gereinigtes Wasser, 10%ige Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung.

Inhalt der Packung

Flaschen mit 50 ml [N1] und 500 ml [N3] Lösung zur Anwendung auf der Haut

Pharmazeutischer Unternehmer

Winthrop Arzneimittel GmbH

Industriestrasse 10

82256 Fürstfeldbruck

Tel.: 08141 / 3572 – 0

Fax: 08141 / 3572 – 599

Hersteller

Winthrop Arzneimittel GmbH

Urmitzer Straße 5

56218 Mülheim-Kärlich

Alternativer Hersteller:

Amcapharm Pharmaceutical GmbH, Industriestraße 10-12, 61191 Rosbach

Mitvertrieb

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

65926 Frankfurt am Main

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im **Juli 2007**.

Apothekenpflichtig