



**Gebrauchsinformation:
Information für den Anwender**

SALICYL-VASELIN 10 %

Salbe zum Auftragen auf die Haut
für Kinder ab 1 Jahr und Erwachsene.
Wirkstoff: Salicylsäure

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss dieses Arzneimittel jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist dieses Arzneimittel und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels beachten?
3. Wie ist dieses Arzneimittel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist dieses Arzneimittel aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

Hornhautmittel

Bombastus

1. Was ist dieses Arzneimittel und wofür wird es angewendet?

Salicyl-Vaseline 10 % ist ein Hornhautmittel.

Diese Salbe wird äußerlich angewendet bei:

- vermehrter Hornhautbildung (Hyperkeratosen),
- Hühneraugen (Clavus),
- Schwielen (Kallus).

2. Was müssen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels beachten?

2.1 Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile von Salicyl-Vaseline 10 % sind,
- bei Kontaktüberempfindlichkeit,
- während der Schwangerschaft,
- bei Säuglingen,
- bei eingeschränkter Nierenfunktion.

2.2 Besondere Vorsicht bei der Anwendung dieses Arzneimittels ist erforderlich,

wenn die unter Kapitel 1 beschriebenen Beschwerden verstärkt auftreten. Fragen Sie in diesem Fall Ihren Arzt oder Apotheker.

2.3 Kinder

Wenden Sie Salicyl-Vaseline 10 % grundsätzlich nicht bei Säuglingen an.

2.4 Bei Anwendung dieses Arzneimittels mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Salicylsäure kann die Aufnahme anderer, an gleicher Stelle aufzutragener Arzneimittel verstärken. Vom Körper aufgenommene Salicylsäure verzögert den Abbau von Methotrexat und verstärkt die Wirkung von Sulfonylharnstoffen.

2.5 Schwangerschaft und Stillzeit

Wenden Sie Salicyl-Vaseline 10 % nicht während der Schwangerschaft an.

Während der Stillzeit darf Salicyl-Vaseline 10 % nicht im Brustbereich angewendet werden.

Stillende dürfen Salicyl-Vaseline 10 % zur Behandlung von Hühneraugen nur für Flächen bis 5 cm² verwenden.

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

2.6 Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung zum Bedienen von Maschinen vor.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

3. Wie ist dieses Arzneimittel anzuwenden?

Wenden Sie Salicyl-Vaseline 10 % immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

3.1 Dosierung und Art der Anwendung

Alter bzw. Körpergewicht	Maximale Tagesdosis Salbe	Maximale Tagesdosis Wirkstoff
Kinder bis 12 Jahre	2 g	0,2 g
Erwachsene	20 g	2,0 g

Tragen Sie Salicyl-Vaseline 10 % ein- bis zweimal täglich auf die Haut auf.

3.2 Dauer der Anwendung

Wenden Sie Salicyl-Vaseline 10 % ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Tage an.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Salicyl-Vaseline 10 % zu stark oder zu schwach ist.

3.3 Wenn Sie eine größere Menge dieses Arzneimittels angewendet haben, als Sie sollten

Wenn sich aufgrund der höheren Dosis Beschwerden einstellen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann gegebenenfalls über erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unter Nebenwirkungen aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Salicyl-Vaseline 10 % Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

4.1 Mögliche Nebenwirkungen:

Auf den Stellen, an denen Salicyl-Vaseline 10 % aufgetragen wurde, kann es zu Hautreizungen kommen.

In sehr seltenen Fällen kann es zu einer vorher nicht bekannten Überempfindlichkeitsreaktion (Kontaktsensibilisierung) gegenüber Salicylsäure kommen.

4.2 Besondere Hinweise:

Wenden Sie Salicyl-Vaseline 10 % nicht weiter an, wenn die oben genannten Nebenwirkungen bei Ihnen auftreten sollten. Sprechen Sie gegebenenfalls mit Ihrem Arzt oder Apotheker darüber, der entscheiden wird, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist dieses Arzneimittel aufzubewahren?

5.1 Allgemeine Hinweise

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

5.2 Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25 °C lagern.

Im Originalbehältnis fest verschlossen aufbewahren.

6. Weitere Informationen

6.1 Was dieses Arzneimittel enthält

100 g Salbe enthalten den Wirkstoff: 10 g Salicylsäure. Die sonstigen Bestandteile sind: dünnflüssiges Paraffin, weißes Vaseline.

6.2 Wie das Arzneimittel aussieht und Inhalt der Packung

Salicyl-Vaseline 10 % ist in folgender Packungsgröße erhältlich: 100 g Salbe in einer Tube mit Umkarton.

Dieses Arzneimittel ist in weiteren Stärken erhältlich: Salicyl-Vaseline 2 % und Salicyl-Vaseline 5 %. Jeweils 100 g Salbe in einer Tube mit Umkarton.

6.3 Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller

Bombastus-Werke AG
Wilsdruffer Straße 170, D-01705 Freital
Tel.: 0351-65803-0, Fax: 0351-65803-99
E-Mail: info@bombastus-werke.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 05/2008.