

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

### Fucidin® Salbe

20 mg/g

### Fucidine® Salbe

20 mg/g

Natriumfusidat



**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

Die Packungsbeilage enthält Informationen zu den folgenden Punkten:

- 1. Was ist Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe und wofür wird es angewendet?**
- 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe beachten?**
- 3. Wie ist Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe anzuwenden?**
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**
- 5. Wie ist Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe aufzubewahren?**
- 6. Weitere Informationen**

#### 1. WAS IST FUCIDIN® SALBE/FUCIDINE® SALBE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe enthält Natriumfusidat und ist ein Steroidantibiotikum, das sich zur lokalen Behandlung von infizierten Hauterkrankungen eignet, die durch Fusidinsäure-empfindliche Bakterien hervorgerufen werden.

#### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON FUCIDIN® SALBE/FUCIDINE® SALBE BEACHTEN?

**Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Fusidinsäure oder einen der sonstigen Bestandteile von Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe sind.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe ist erforderlich:**

Bei der Behandlung im Genital- oder Analbereich, da es wegen der Hilfsstoffe Paraffin und Vaseline bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen kann.

**Bei Anwendung von Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

*Schwangerschaft:*

Wenn Sie schwanger sind, dürfen Sie Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe nur auf ausdrückliche Anweisung Ihres Arztes anwenden, und nur nachdem dieser eine strenge Nutzen-Risiko-Abwägung vorgenommen hat, da bisher keine klinischen Erfahrungen mit der Anwendung von Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe an Schwangeren vorliegen.

Eine großflächige Anwendung ist zu vermeiden. Aus Tierversuchen liegen keine Hinweise auf ein Missbildungsrisiko durch Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe vor.

*Stillzeit:*

Fusidinsäure, der Wirkstoff von Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe, geht in die Muttermilch über. Beim gestillten Säugling können deshalb Durchfälle und Sprosspilzbesiedlung der Schleimhäute auftreten, so dass unter Umständen abgestillt werden muss. An die Möglichkeit einer Sensibilisierung sollte gedacht werden. Wenn Ihr Arzt eine Behandlung mit Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe für erforderlich hält, ist darauf zu achten, dass der Behandlungszeitraum so kurz wie möglich ist. Eine großflächige Anwendung ist unbedingt zu vermeiden. Wenn Sie stillen, dürfen Sie Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe im Brustbereich nicht anwenden. Ein Kontakt des Säuglings mit behandelten Körperstellen ist unbedingt zu vermeiden.

#### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Eine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit oder der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen ist nicht bekannt.

#### Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe

Sowohl Cetylalkohol als auch Wollwachs können örtlich begrenzt allergische Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

#### 3. WIE IST FUCIDIN® SALBE/FUCIDINE® SALBE ANZUWENDEN?

**Wenden Sie Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.**

Falls vom Arzt nicht anders verordnet ist die übliche Dosis:

- Tragen Sie die Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe 3-mal täglich auf und decken Sie sie mit einem Verband ab.
- Zur Sanierung des Nasenraumes bringen Sie Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe 2-mal täglich mit einem Stäbchen in die Nase ein.
- Ihr Arzt entscheidet über die Dauer der Anwendung.
- Die Behandlung erfolgt im Allgemeinen bis zum Abheilen der Hauterscheinungen.

Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe ist auch für die Anwendung bei Kindern geeignet.

**Wenn Sie eine größere Menge von Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe angewendet haben, als Sie sollten,**

informieren Sie Ihren Arzt, der ggf. erforderliche Maßnahmen einleiten wird.

**Wenn Sie die Anwendung von Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie eine vorherige Anwendung vergessen haben. Bitte setzen Sie die Behandlung mit der vorgeschriebenen Menge Salbe fort.

**Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.**



#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe Nebenwirkungen hervorrufen, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<b>Sehr häufig:</b>	mehr als 1 von 10 Behandelten
<b>Häufig:</b>	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
<b>Gelegentlich:</b>	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
<b>Selten:</b>	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
<b>Sehr selten:</b>	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

Bei größerflächigen, offenen Hautverletzungen kann zu Beginn der Behandlung ein vorübergehendes leichtes Brennen auftreten. In sehr seltenen Fällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut möglich.

Nach Anwendung von Tabletten und Infusionen mit dem Wirkstoff Fusidinsäure ist in Einzelfällen über eine Verminderung der Zahl der weißen Blutkörperchen und der Blutplättchen berichtet worden. Bei der äußerlichen Anwendung dieses Wirkstoffes sind diese Nebenwirkungen nicht bekannt geworden.

**Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.**

#### 5. WIE IST FUCIDIN® SALBE/FUCIDINE® SALBE AUFZUBEWAHREN?

- Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Karton und der Tube angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

#### Aufbewahrungsbedingungen

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Aufbewahrungsbedingungen erforderlich.

#### Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Nach Anbruch ist die Salbe 4 Wochen haltbar.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

**Was Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe enthält**

Der **Wirkstoff** ist:

1 g Salbe enthält 20,0 mg Natriumfusidat.

Die **sonstigen Bestandteile** sind:

- Cetylalkohol (Ph.Eur.)
- all-rac- $\alpha$ -Tocopherol
- dünnflüssiges Paraffin
- weißes Vaseline
- Wollwachs

**Wie Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe aussieht und Inhalt der Packung**

Packungen zu 15 g und 30 g Salbe

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Importeur

Einfuhr, Umpackung und Vertrieb:  
kohlpharma GmbH, Im Holzhau 8, 66663 Merzig

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

Fucidin in Österreich, Belgien, Italien, Irland, Griechenland, Niederlande, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn, Litauen, Rumänien und Vereinigtes Königreich

Fucidine in Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im: Januar 2012

#### EIGENSCHAFTEN

Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe ist ein spezifisches Hautantibiotikum. Die gute Wirksamkeit zeigt sich im schnellen Abklingen der Infektion, also im Nachlassen von Schmerz, Spannung und Druck und einer raschen Eliminierung der Krankheitserreger.

Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe bietet neben den therapeutischen Vorteilen der antibakteriellen Wirksubstanz besondere Vorzüge, wenn chronisch krustige Hautinfektionen vorliegen. Fucidin® Salbe/Fucidine® Salbe hält Feuchtigkeit zurück und weicht dadurch harte Krusten auf.



® Fucidin und Fucidine sind eingetragene Marken der LEO PHARMA A/S