

## Gebrauchsinformation

### RECESSAN

Lauromacrogol 400 (Polidocanol) 30 mg/g

Schmerzbetäubende Salbe für die Mundschleimhaut

*Liebe Patientin, lieber Patient!*

*Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.*

*Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Recessan jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.*

- a) Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.*
- b) Fragen Sie Ihren Zahnarzt, Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.*
- c) Wenn bei akuten Beschwerden nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Zahnarzt oder Arzt aufsuchen.*

*Diese Packungsbeilage beinhaltet:*

1. Was ist Recessan und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Recessan beachten?
3. Wie ist Recessan anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Recessan aufzubewahren und weitere Informationen
6. Stand der Information

# **1 WAS IST RECESSAN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Zur zeitweiligen, symptomatischen Behandlung von schmerzhaften entzündlichen Erkrankungen an Zahnfleisch und Mundschleimhaut.

## **2 WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON RECESSAN BEACHTEN?**

### **2.1 Recessan darf nicht angewendet werden**

- bei Überempfindlichkeit gegen Lauromacrogol 400 (Polidocanol) oder gegen einen der anderen Inhaltsstoffe.

### **2.2 Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Recessan ist erforderlich**

#### ***Schwangerschaft und Stillzeit***

Es gibt bislang keine Hinweise auf eine keimschädigende Wirkung oder Gefährdung des Säuglings durch Recessan. Da jedoch kontrollierte Studien nicht vorhanden sind, sollte die Verabreichung an schwangere und stillende Frauen nur unter besonders sorgfältiger Abwägung von Nutzen und Risiko erfolgen.

Es liegen keine hinreichenden Daten zur Anwendung von Recessan an Schwangeren vor. Wenn Sie schwanger sind, dürfen Sie Recessan nicht anwenden, es sei denn, dies ist eindeutig notwendig.

Es liegen keine hinreichenden Daten zur Anwendung von Recessan während der Stillzeit vor. Wenn Sie stillen, dürfen Sie Recessan nicht anwenden, es sei denn, dies ist eindeutig notwendig.

#### ***Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen***

Es sind keine Besonderheiten zu beachten.

#### ***Wichtige Warnhinweise zu bestimmten sonstigen Bestandteilen von Recessan***

Keine.

### **2.3 Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

Durch die Anwendung von Recessan kann die Wirkung anderer Lokalanästhetika (z. B. Infiltrations- oder Leitungsanästhesie) verstärkt werden.

## **3 WIE IST RECESSAN ANZUWENDEN?**

### **3.1 Art der Anwendung**

Tragen Sie die Salbe leicht auf die Schmerz-, Druck- und Entzündungsstellen in der Mundhöhle auf. Nicht einreiben.

Bei Zahnprothesen tragen Sie bitte Recessan auf die gereinigte und eben noch feuchte Prothese bzw. Immediat-Prothese auf. Die Anwendung eines zusätzlichen Haftmittels ist nicht erforderlich und sollte unterbleiben.

Nach der Anwendung von Recessan sollten Sie 1 Stunde lang nicht essen oder trinken, weil das Präparat einen haftenden Film bildet, der dann vorzeitig abgetragen würde.

### **3.2 Dosierungsanleitung**

Verwenden Sie 3mal täglich ein etwa erbsengroßes Stück.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Zahnarzt, Arzt oder Apotheker.

## **4 WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Sehr selten (< 0,01 %, einschließlich Einzelfälle):

### ***Erkrankungen des Immunsystems***

- allergische Überempfindlichkeitsreaktion (anaphylaktische Reaktion)
- Angioödem (auch bekannt als Quincke-Ödem; Symptome sind plötzlich auftretende Schwellungen, vor allem im Gesicht z. B. der Augenlider, Lippen oder des Kehlkopfs)
- Überempfindlichkeit

### ***Erkrankungen des Nervensystems***

- Geschmacksstörung
- Brennen

### ***Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort***

- Missempfindungen an der Applikationsstelle (Parästhesie)
- Verfärbung an der Applikationsstelle
- Erythem an der Applikationsstelle
- lokale Schwellung

### ***Unbekannte Nebenwirkungen***

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Zahnarzt, Arzt oder Apotheker mit.

## **5 WIE IST RECESSAN AUFZUBEWAHREN UND WEITERE INFORMATIONEN**

### **5.1 Verfallsdatum**

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Tube und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung bitte nicht mehr nach diesem Datum.

### **5.2 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung**

Keine.

### **5.3 Haltbarkeit nach dem erstmaligen Öffnen**

3 Monate.

### **5.4 Warnung vor sichtbaren Qualitätsmängeln**

Entfällt.

### **5.5 Zusammensetzung**

1 g Salbe enthält

als arzneilich wirksamen Bestandteil:

Lauromacrogol 400 (Polidocanol) 30 mg

*weitere Bestandteile:*

Aluminium-(RS)-lactat, Bitterfenchelöl, Natriumalginat, dickflüssiges Paraffin, Saccharin-Natrium, dalmatinisches Salbeiöl, hochdisperses Siliciumdioxid, Sternanisöl, Thymol, Titandioxid, weißes Vaseline.

## **5.6 Darreichungsform und Inhalt**

Tube mit 10 g Salbe.

## **5.7 Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Rheingaustraße 87-93

D - 65203 Wiesbaden

[www.kreussler.com](http://www.kreussler.com)

E-Mail: [info@kreussler.com](mailto:info@kreussler.com)

# **6 STAND DER INFORMATION**

Januar 2012

---

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Weitere Informationen zu Recessan

Recessan bewirkt eine rasch einsetzende und bis zu zwei Stunden anhaltende, örtlich begrenzte Schmerzstillung. Die besonders guten Haftigenschaften auf der feuchten Mundschleimhaut werden durch die spezielle patentierte Zusammensetzung der Salbengrundlage erreicht. Der angenehme Geschmack wird durch pflanzliche Stoffe bewirkt.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6430829.00.00

Kreussler Pharma - Logo