


Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Ilio Funkton[®], Kautabletten



Wirkstoff: Simeticon 85 mg
entsprechend Dimeticon 80 mg

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Ilio-Funkton[®] jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Bewahren Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Ilio-Funkton[®] und wofür wird es eingenommen?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Ilio-Funkton[®] beachten?
3. Wie ist Ilio-Funkton[®] einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Ilio-Funkton[®] aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Ilio-Funkton[®] und wofür wird es eingenommen?

Ilio-Funkton[®] ist ein Arzneimittel gegen Blähungen.

Bei übermäßiger Gasbildung und Gasansammlung im Magen-Darm-Bereich (Meteorismus, Flatulenz, Aerophagie, Roemheld-Syndrom); vor diagnostischen Untersuchungen im Bauchbereich zur Reduzierung von Gasschatten im Röntgenbild; bei verstärkter Gasbildung nach Operationen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Ilio-Funkton® beachten?

Ilio-Funkton® darf nicht eingenommen werden,
-wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Simecton, Levo-
menthol oder einem der sonstigen Bestandteile von Ilio-Funkton®
sind.

Bei Einnahme von Ilio-Funkton® mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arz-
neimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenom-
men/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von Ilio-Funkton®
Kautabletten während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Ilio-Funkton®

Dieses Arzneimittel enthält Lactose und Sorbitol. Bitte nehmen Sie
Ilio-Funkton® daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn
Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber
bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist Ilio-Funkton® einzunehmen?

Nehmen Sie Ilio-Funkton® immer genau nach der Anweisung in die-
ser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apo-
theker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

nehmen Sie 1–2 Ilio-Funkton® Kautabletten zu oder nach den Mahl-
zeiten ein und zerkauen sie. Bei Bedarf können Sie auch vor dem
Schlafengehen 1–2 Kautabletten einnehmen.

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der
Beschwerden. Ilio-Funkton® Kautabletten können, falls erforderlich
über längere Zeit eingenommen werden.

Ilio-Funkton® ist für Diabetiker geeignet. Eine Kautablette entspricht 0,027 BE.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Ilio-Funkton® eingenommen haben, als Sie sollten

Vergiftungen nach Anwendung von Ilio-Funkton® Kautabletten sind nicht bekannt.

Der Wirkstoff von Ilio-Funkton® Kautabletten bringt den Schaum im Magen-Darm-Kanal auf rein physikalischem Wege zur Auflösung und ist chemisch und biologisch vollkommen unwirksam. Deshalb ist eine Vergiftung ausgeschlossen. Auch große Mengen Ilio-Funkton® Kautabletten werden problemlos vertragen.

Wenn Sie die Einnahme von Ilio-Funkton® vergessen haben

In diesem Fall können Sie die Einnahme nachholen.

Wenn Sie die Einnahme von Ilio-Funkton® abbrechen

In diesem Fall kann es zu einem Wiederauftreten der Beschwerden kommen.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es wurden bisher keine Nebenwirkungen beobachtet.

Sollten Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Ilio-Funkton® aufzubewahren?

Arzneimittel sollen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden. Das Verfallsdatum ist auf der Durchdrückpackung und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

An die Aufbewahrung sind keine bestimmten Anforderungen zu stellen.

6. Weitere Informationen

Was Ilio-Funkton® enthält:

Der arzneilich wirksame Bestandteil von Ilio-Funkton® ist Simeticon. 1 Kautablette enthält 85 mg Simeticon, entsprechend 80 mg Dimeticon.

Die sonstigen Bestandteile sind Sorbitol, Lactose-Monohydrat, Mikrokristalline Cellulose, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat und Levomenthol.

Wie Ilio-Funkton® aussieht und Inhalt der Packung:

Ilio-Funkton® Kautabletten sind weiß mit einseitiger Bruchkerbe und in Packungen zu 20 Kautabletten und 50 Kautabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Robugen GmbH
Pharmazeutische Fabrik
Alleenstraße 22-26
73730 Esslingen
Tel.: 0711 / 136 30-0
Fax: 0711 / 36 74 50
Email: info@robugen.de
Internet: www.robugen.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im:

Oktober 2013