

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation aufmerksam, sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Pentofuryl

Wirkstoff: Nifuroxazid

Zusammensetzung:

1 Kapsel enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: Nifuroxazid 200 mg

sonstige Bestandteile: Stärke, Saccharose, Magnesiumstearat, Gelatine

Hinweis:

1 Kapsel enthält 0,072g Saccharose entsprechend 0,006 BE

Originalpackungen mit 16 Kapseln, 32 Kapseln

Pentofuryl ist ein Durchfallmittel (Darmantiseptikum)

Pharmazeutischer Unternehmer:

Linden Arzneimittel-Vertrieb GmbH – Rodheimer Straße 90 – 35452 Heuchelheim

Telefon: 0641 – 9626610 Telefax: 0641 - 62817

Hersteller:

Lavipharm S.A. - Agias Marinas Str. - GR-19002 Peania

Anwendungsgebiete:

Akute und chronische Durchfallerkrankungen infolge von Infektionen mit nifuroxazidempfindlichen Erregern.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Pentofuryl nicht anwenden?

Gegenanzeigen sind keine bekannt.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wegen nicht ausreichender Untersuchungen soll das Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind keine bekannt

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt Pentofuryl nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Pentofuryl sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel und wie oft sollten Sie Pentofuryl einnehmen?

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder ab dem 10. Lebensjahr 2 bis 4 Kapseln über den Tag verteilt ein.

Wie lange sollten Sie Pentofuryl einnehmen?

Pentofuryl sollte nur in ärztlich begründeten Ausnahmefällen länger als 7 Tage angewendet werden.

Wie und wann sollten Sie Pentofuryl einnehmen?

Die Kapseln werden mit Flüssigkeit (z.B. 1 Glas Wasser) eingenommen. Der Inhalt von Pentofuryl Kapseln kann auch mit den Mahlzeiten vermischt eingenommen werden. Nifuroxazid löst sich nicht in Wasser.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Was ist zu beachten, wenn Pentofuryl in zu großen Mengen angewendet wurde?

Da der Wirkstoff von Pentofuryl nicht resorbiert wird, sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Pentofuryl auftreten?

Es sind keine Nebenwirkungen unter der Therapie mit Pentofuryl bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Blisterstreifen und der Faltschachtel aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nicht über 25°C aufbewahren

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information: November 2007